

# ACCU-CHEK® Performa

## TESTS

REF 06453996 / 06454011 / 0896648

**HU**  
Önellenőrzésre szolgáló eszköz  
Betegközeli laboratóriumi diagnosztikára használt eszköz

## Rendeltettsésszerű használat

Az Accu-Chek Performa rendszer az Accu-Chek Performa vércukormérő családhoz, az Accu-Chek Performa tesztcsíkokhoz és az Accu-Chek Performa kontrollolajhoz és az Accu-Chek lineártámi tesztcsíkokhoz köthető.

A vércukormérő használati tesztcsíkok a glikózatot mennyiségi mértékére a hőszín kapilláris, vénás, arteriális és jóvájáróban, valamint szegesítőkben a glikémés kontroll hatékonyan nyomon követhetően javultak. A diabetesben szerevedő személyek önmérőzésére és az egészségügyi szakszemélyzet által betegközeli laboratóriumi diagnosztikára szolgálnak. Az egészségügyi szakszemélyzet által klinikai körülmények között és a diabetesben szereződő által olyan vércukormérő használati utánpótlásban talál.

Az Accu-Chek Performa vércukormérő családhoz történő méréshez használt tesztcsíz az ijj, a tenyér, alkar és a felkar. Ha a vércukormérőt iszulnypárnával együtt használja, csak ujjbegybeli végezzen mérést.

A rendszerek nem használhatnak a cukortarteges diagnosztizálásra vagy szükséges, sem ujjszelküldő köldöknyelőről származó vérmátrixról visszállára. Vénd, arteriális vés és ujjszelküldő teljes vérenkő vércukormérőt kizárolja egészségügyi szakszemélyzet vezetéhez.

## Felhasználói információk

**Fontos információk:** Ezek a tesztcsíkok zöld szimbólummal vannak jelölt, hogy megkölikönözőlegések legyenek korábbi tesztcsíkokkal, melyeket klinikailag jelentős mértékben befolyásolt a mérőz. A zöld szimbólum a tesztcsík dobozban és a tesztcsík téglé címején van feltüntetve.

**Jegyzőkönyvi adatok**

Bevetésre Olvasva ezt a betegjákozatot és a használati utánpótlát mielőtt megméri a vércukrot. A vércukor rendszer ellenőrzése segíti az embert, hogy jobban kezelje cukorbetegségét. Orvosi vizsgálatok után mutatják, hogy Ón a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyzet közül minden szinten tudta tartani az Ón vércukrát. Ez a cukortarteges szövődményekkel járult a betegközeli felügyelésre és önmérőzésre köthetően.

A FIGYELMEZTETÉS előre látható súlyos veszélyt jelez.

**ÖNVEZÉKEDÉS** ismereti azt az intézkedést, amelyet meg kell tennie a termék biztonságos használatára vagy a termék károsodásának megakadályozása érdekében.

## FIGYELMEZTETÉS

**Fülládszervező** Ez a termék kisiméretű alkotászeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. A kisiméretű alkotászek elszáva tarlánkok kisgyermekekkel is olyan személyekkel, akik lenyelhetik azokat.

**Súlyos egészségügyi esemény veszélye** A mérőz utasítások, illetve a tesztcsíkok tárolására és kezelésére vonatkozó utasítások be nem tartása hibás mérőz eseményekhez vezethet.

Gondosolva ezzel a mérőz használati utánpótlára és a tesztcsíkok és kontrollolajok betegjákozatnak utasításával.

A tesztcsíkok elszávala előtt ellenőrizze a tesztcsík tégléjét. Ha használja a tesztcsíkokat, ha bármilyen részt lát a téglében, ha valami akadályozza a kupak megfelelő zárolását, illetve, ha a zöld szimbólum elöl a téglélyt már kinyitott. Egyes működés ellenőrzést. Forduljon a Roche-hoz. A sérült tesztcsíkok pontatlan eredményeket okozhatnak, ami helytelen kezeléshez vezethet.

**Fertőzésveszély** Az ember vár fertőzések átvitelének potenciális forrása. Ne tegyen ki más embereket személyezett alkotászokat. A használt tesztcsík fertőző anyagnak dobja ki a helyi szabályokhoz összhangban.

## A csomag tartalma

Tesztcsíkok, valamint betegjákozatokat tartalmazó csomag. Mivel a reaktív anyagok rendkívül kissé mennyiségen vannak, így az EU szabványában alapján a csomag tartalma nem tekintendő veszélyes anyagnak. Kérjük esetén forduljon a Roche-hoz.

A csomagolásban lévő bármely tarték be szokványos hárítási hulladékba.

**A tesztcsíkok tárolása és kezelése** • A tesztcsíkokat 2 és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne fagyassza le a tesztcsíkokat.

• A tesztcsíkokat 8 és 44 °C közötti páratartalomon bellett használja. A tesztcsíkokat ne tárolja magas hőmérsékleten és nedves helyen, a fűrészdeben vagy a kompresszorban.

• A fel nem használt tesztcsíkokat az eredeti tesztcsík tégléjében, lezárt kúpakkal tárolja.

• Mután kivegne a tesztcsíkot, azzal zárja le szorosan a tesztcsík tégléjét, hogy a tesztcsíkokat megvédje a páratartalomtól.

• A tesztcsíkokat azonnal használja fel, mitnen kivette a tesztcsík tégléjét.

• Dobja ki a tesztcsíkot, ha szavatossági idejét lejárta. Lejtéssel a tesztcsík doboz és a tesztcsík tégléjében címkezik a szimbólum mellett. A tesztcsíkok megfelelő tárolás és használat esetén a felülnézetű szavatossági idő lejtáján használható fel. Ez vonatkozik az új, bontatlan tesztcsík tégléjében és a felhasználó által felbontott tesztcsík téglében egyaránt.

• Egy tesztcsíkot csak egyszer használjon fel. A tesztcsíkok csak egyszer használatra valók.

## Vércukormérés elvégzése

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

7. Tavolítsa el és dobja ki a használt tesztcsíkot.

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

7. Tavolítsa el és dobja ki a használt tesztcsíkot.

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

7. Tavolítsa el és dobja ki a használt tesztcsíkot.

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

7. Tavolítsa el és dobja ki a használt tesztcsíkot.

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

7. Tavolítsa el és dobja ki a használt tesztcsíkot.

**Megjegyzés:** Ha a vércukormérőt aktiváló chipre van szüksége, akkor ilyen chipet forduljon a Roche-hoz.

Ha az Ón vércukormérő nem jö, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérni a vércukrot. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyeztetést.

**Vércukormérőt előtt szükséges a szürés helyét.**

1. Mosszon ki szükséges meleg vízzel. Öltözzse le, és törlje a kezét teljesen szárazra.

2. Készítse el az ujjbegybeli.

3. Ellenőrizze a tesztcsík tégléjén a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíket, ha a szavatosság idő lejárta.

4. Helyezze el a tesztcsíkot a vércukormérőre a nyílak irányában. A vércukormérő bekapcsol.

5. Az ujjbegybelről nyerjen egy vércseppeket.

6. Érintse hozzá a vércseppeket a tesztcsík található sárga mező elülső részéhez. Vegye le az ujját a tesztcsíkot, amikor megjelenik a szimbólum. Ne vigyen fel vércseppeket a tesztcsík tetéjére.

